

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-6-65 38861

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS** (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS  
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

**ABONNEMENT ANNUEL**

**15 Francs**

Supplément n° 4 au Bulletin Technique n° 57

23 JUIN 1965

- 22 -

AVERTISSEMENTS

VIGNES

## MILDIOU DE LA VIGNE

Comme il était à craindre les pluies orageuses de la semaine écoulée ont provoqué une extension de la maladie. On peut considérer que le Mildiou est présent en toutes régions. Cependant, l'importance de ses manifestations est très variable suivant les parcelles.

Les pluies de ces derniers jours ont très souvent lessivé le traitement conseillé dans notre Bulletin du 16 Juin. De plus, la végétation s'est développée depuis ce traitement. D'autre part, nous arrivons au stade de pré-floraison, stade où les grappes sont très sensibles à la maladie.

En conséquence, il est conseillé d'effectuer un nouveau traitement qui devra être terminé avant la fin de la semaine.

## BLACK-ROT DE LA VIGNE

Le traitement effectué contre le Mildiou est efficace contre le Black-Rot.

## ARBRES FRUITIERS

### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les conditions climatiques de la semaine écoulée ont été très favorables à l'activité de ce ravageur. Des pontes ont été déposées et de nombreuses pénétrations sont à craindre durant les prochains jours. La protection des fruits doit donc rester parfaite.

Il y a donc lieu de renouveler le traitement conseillé dans notre Bulletin du 12 Juin dans tous les cas où celui-ci aura été lessivé par les pluies.

### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Des manifestations parfois très importantes de la maladie peuvent être observées actuellement dans les vergers insuffisamment protégés pendant la période pluvieuse qui a débuté le 26 Mai.

Ces manifestations peuvent être à l'origine de contaminations graves si l'été et l'automne sont pluvieux. Dans tous les vergers où des taches sont observées, la cadence des traitements sera fixée par l'arboriculteur lui-même en fonction du lessivage des produits par les pluies et du grossissement des fruits.

P./S.7

INFORMATIONSVIGNESOIDIUM DE LA VIGNE

Il est conseillé d'ajouter un soufre mouillable à la bouillie destinée à combattre le Mildiou de la vigne.

Un soufrage est conseillé pendant la floraison de la vigne.

ARBRES FRUITIERSANTHRACNOSE DU CERISIER

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement de cette maladie. Nous rappelons les indications données dans notre Bulletin du 4 Juin.

Il est conseillé d'effectuer un traitement immédiatement après la récolte sur toutes les variétés sensibles à la maladie.

HYPONOMEUTE DU POMMIER ( Chenille défoliatrice )

L'activité de ce ravageur est observée sur de nombreux pommiers. Il est donc conseillé d'être vigilant afin d'intervenir le cas échéant.

ARBRES FRUITIERS - VIGNESDEGATS DE GRELE

Nous rappelons qu'en cas de chute de grêle un traitement fongicide destiné à désinfecter les blessures et à favoriser leur cicatrisation doit être effectué dans les plus brefs délais quelle que soit la date du traitement précédent.

BETTERAVESPEGOMYIE DE LA BETTERAVE

Des pontes et des éclosions sont observées dans les cultures.

Seule une observation attentive permettra de juger de l'opportunité du traitement. On pourra utiliser, le cas échéant, un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

PUCERONS DE LA BETTERAVE

Ces ravageurs sont signalés dans certaines cultures. Il est donc conseillé de choisir, le cas échéant, un produit à la fois efficace contre la Pégomyie et les Pucerons.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles,  
G. RIBAUT.  
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,  
G. BENAS.